

**HARI** Question Bank

東洋医学シリーズ

# クエスチヨン バンク

鍼灸臨床学演習  
鍼灸臨床学実習

蛭東洋医学研究所

## 目次

鍼灸臨床学演習	・ ・ ・ ・ ・	3
鍼灸臨床学実習Ⅰ	・ ・ ・ ・ ・	10
鍼灸臨床学実習Ⅱ	・ ・ ・ ・ ・	13
鍼灸臨床学実習Ⅲ	・ ・ ・ ・ ・	18
鍼灸臨床学実習Ⅳ	・ ・ ・ ・ ・	21

※ページ番号はpdfファイルのページになります。

## 本書の使い方

- ✓ 左半分 穴埋め問題になっています
- ✓ 右半分 回答文になっています
- ✓ 右半분을隠して、左半分を見ながら、  
右側の内容が答えられるよう暗記しましょう

# 鍼灸臨床学演習

# 鍼灸臨床学 (演習) ①

① 頸肩痛 疾患

○○○

○○○

○

① 230

主訴 肩こり

鑑別検査

問診検査

触診 触診

経路

経路

① 筋性 筋性

② 筋性

○ 頸上肢神経痛, 肩こり, 肩痛. [後述の通り] (○)

鑑別検査 肩こり, 肩痛, 肩痛

治療

不足

○ 頸-肩痛, PC, 筋性, 肩こり, 肩痛 [後述の通り] (○)

安静時痛 腕痛, 肩痛

治療

不足

[2] 肩痛 疾患 大筋 〇〇〇〇

① 40

〇〇〇〇

② 20

③ 40 〇〇 症候群

主訴検査 4

〇〇〇〇

鑑別 〇 / 触診, 触診

○ 右肩痛, 2000 年, 冷感, 右肩痛, 肩外側 (○)

安静時痛 腕痛, 肩痛

治療

不足

右肩-腕痛の通り

頸椎症, 頸椎椎間板ヘルニア, 肩関節周囲炎

胸部出口症候群. 肩こり. 後頸部帯状疱疹

リウマチ,

頸椎神経根症, 筋性筋痛, 頸椎症

① 頸椎症, 2100 年, 2100 年, 頸椎 ROM (前屈, 側屈, 回旋)

肩関節 (二頭筋, 三頭筋, 腕橈骨筋), SD, 胸部出口 (頸椎, 肩)

中絶検査 (中絶, HLH)

2100 年 / 頸椎症, 腕橈骨, 筋性筋痛

手肘痛, 足太痛, 手肘痛

小腸, 肝臓, 三焦

頸椎症, 肩こり, 肩痛, 肩痛, 肩痛

頸椎症周囲の筋性筋痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

頸椎症 (頸椎, 肩, 中絶検査) 進行性, 肩痛

② 頸椎症, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

大筋, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

頸椎症周囲の筋性筋痛 (頸椎症周囲の筋性筋痛) 進行性, 肩痛

肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

小腸, 肝臓, 肩痛, 肩痛, 肩痛

腕痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

五十肩, 肩痛, 頸椎症, 胸部出口症候群

腕痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

頸椎症, 頸椎椎間板ヘルニア

肩関節, 腕痛, 肩痛, 肩痛

2100 年, 2100 年, 2100 年, 肩 ROM (前屈, 側屈, 回旋)

肩関節, 腕痛, SD, 胸部出口, 中絶検査 / 肩痛, 肩痛

肩関節周囲炎 (五十肩, 腕痛, 腕痛, 腕痛) 進行性, 肩痛

肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

腕痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

陽炎, 腕痛, 中絶, 腕痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛, 肩痛

2100 年, 2100 年, 2100 年



१२३

0 0 0 0 0

體列板匱

治法

知 3

治府. 34

知悉

[4] 脐痛 大乙(4)

① 37

7. 将5.1.2. 脱色液用, 蒸馏水, 洗液瓶。

知以類心 來昔.

所. 又

• 性状的= 腺垂体, 垂后, 腺垂体, 及, 垂后, 垂体变化.

郭正时 舟中

五、平假名

24

 $\lambda \sim \bar{\rho}$ 

• 强列 股图所 3 / 仙幅 12 / 節 20

• 租价 20 股 70000 元

渡門. 中滿. 巨骨. 臨垣. 兼國. 肩貞 40/16. LU10<sub>mm</sub>

肩胛骨, 肩胛 MOX 未解大, 八片, 3 亿

五十四、跖趾疾急，胸部，绞扼和降音，腹和腹

束柄种及麻序(枳壳, 尺骨, 正冲御昆)

手根管、肘部管、肘管、/ 卜71011 病，日相指，工部有外科工部

7-11. プレン, ハルツァ, 341. 137 / 1407, 中拍印展

劉相繼, 奉祀神主降香, 怪文印, 有司部同公天. 中祀計及班直

月日郭土。症候詳(今向品) 王七-七六-1102(+). 如有, 今向品互相

回忆及著。前陈陈系各。1公+经济

天柱. 何甲. 天鼎. 屋脊. 中柱. 小. 3. 面 40116 LW10

件門 190x 米粒大 10分先 3月

上海九百外阿上跑天(1-400). 中拾11P名(11) 玉珠, 左相

夏生站心内病机, 按至儿十上知小, 明年陽明經師師記  
疾形難知, 國治的至心, 前學除行和

曲20 今天 阿曼尔 48/16 (NIR...)

一問 三問 Max 半減率 1/3 全 3 倍

寸20:  $H(t) = \frac{1}{2}gt^2$

[illegible]

推測1型常性哮喘, 為推測組A1型, 變異性哮喘

將推相關性 $\chi^2=?$ ，看能否扶帶症 /  $\chi^2$  檢. ATR, PTR

患者主訴之ak+上肢之病，即此病，足太陽經節候記

[illegible][illegible]

也指体内病变引起之肝功异常 肾时终能

局为①派攻至2000 兵相值和 海军陈维和

腎氣命火 太極命火 參攷 10/11

5年中 MAX 羊毛织大 度融合 3H2

1947年12月21日 10:42 / 11:42 / 12:42 / 13:42 / 14:42 / 15:42 / 16:42 / 17:42 / 18:42 / 19:42 / 20:42 / 21:42 / 22:42 / 23:42 / 24:42

骨髄の高さ 月経推定 - 2" / 225g 降下物品 降下



## 鍼灸臨床学 (演習)

②

頸肩痛 (視診、触診)

肩痛

上肢

腰痛

膝下股痛

膝

[5] 膝下股痛 L2-L5

① L5- [触診、触診、膝関節可動域]

○ 27歳 男性。大腿外側 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

L2-L5 痛 → 膝関節可動域制限あり。L5/S1

治療方針

L5

○ 37歳 男性。股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

股関節可動域制限あり。

治療方針

L5

[6] 膝 - 痛あり

鑑別診断 膝関節 / 腰椎 / 中足

○ 右膝痛。歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

膝関節可動域制限あり。

治療方針

L5

○ 右膝 - 内側痛あり。60歳前、膝関節可動域制限あり。

膝関節可動域制限あり。

治療方針

L5

[7] 腰痛 L2-L6

① 27 ② 37

③ 7

問診 47 / 触診 (表) 27

鑑別

頸 - 痛あり。歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。

歩行時、股関節 - 足の甲 痛。歩行時、膝関節可動域制限あり。



056 才女任, 11月12日增210日 史收的 在11月12日  
1年前, 肾俞, 胆俞, 水泉, 坎宫  
治瘰癧  
如示

052 才男任 胆俞 (在11月12日) 排420p12  
肾俞, 章门, 大椎  
治瘰癧  
如示

(8) 腹痛 持症在右前5

症候4

既病3

022 才男任 210p12, 370p12 左腹痛在右, 里已便  
三焦, 胆俞, 胆俞, 中脘, 天枢, 章门, 胆俞  
如示

043 才女任 210p12, 370p12 左腹痛在右, 里已便  
17日, 中脘, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
如示

检查 6

(9) 咳嗽 患症在5, 拘束任

肉寒性, 肺病性  
呼吸道的 / 呼吸

检查

025 才男任 咳嗽, 肺病性, 肺病性, 肺病性  
及肺病性, 肺病性, 肺病性, 肺病性, 肺病性  
如示

045 才女任, 11月12日增210日 史收的 在11月12日  
中脘, 章门, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
如示  
如示

持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺  
急症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺  
排尿管道性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺  
三腔交一太溪, 太溪, 太溪, 太溪, 太溪  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞

排尿管道性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺  
三腔交一太溪, 太溪, 太溪, 太溪, 太溪  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞

十二指物痰病: 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
急症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺  
痰病, 痰病, 痰病, 痰病, 痰病  
天枢, 上脘, 中脘, 下脘, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞

急症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺  
痰病, 痰病, 痰病, 痰病, 痰病  
天枢, 上脘, 中脘, 下脘, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞

急症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺, 持症性起活肺  
痰病, 痰病, 痰病, 痰病, 痰病  
天枢, 上脘, 中脘, 下脘, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞  
胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞, 胆俞











# 鍼灸臨床学実習 I

## 金沢交臨床学実習Ⅰ

[1] 前屈ROM, 記入, 方法, 注意点, 声07 (0027478)

後屈ROM

側屈ROM

回旋ROM

シムワリテスト, 異常

スローリングテスト, ↑

[2] 上腕二頭筋反射, 有

[3] 腕横指筋反射

上腕三頭筋反射

ホドコニ反射

トルメント反射

SD. (6. 67. 68)

[4] 前上ROM

後上ROM

外転ROM

外旋, 内旋ROM

前外旋, 内旋ROM

前上ROM MMT

後上ROM MMT

外転MMT

スピードテスト, 異常

2-4テスト, "

ヤガーテスト, "

ペインフルサイン

[5] モーレテスト

[6] ライトテスト

元ニテスト

エディンテスト

ハリステスト

4ネルサイン 30

トルメントテスト

中指伸展テスト

60° 基: 肩峰-垂直線, 肘: 肘孔-踵頂線, 5°おき, 首の屈伸

60° ↑

60° (左) P, 基: 肘頭-肘仙, 肘: 肘頭-肘頭 痛部即座: 左右, 肩の屈伸

60° (左) P, 基: 両肩峰, 肘: 肘-後頭部, 後: 5°おき, 肩の屈伸

(+) 両腕, 後屈(P?), 片方の肩(P?), 肩の中心後屈, 肩の神経

(+) 両腕, 後屈(P?), 側屈(P?), 片方の肩(P?), 肩の中心後屈, 肩の神経

(+) 両腕, 上腕二頭筋, 肘の上腕二頭筋, 肘の上腕二頭筋(肘外), 神経C6

(+) 両腕, 中間位(肘屈伸), 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 神経C7

(+) 両腕, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 両腕, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 両腕, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(10), 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

180°, 基: 肩峰-垂直線, 肘: 上腕の, 5°おき, 中間位, 肩の屈伸

50°, ↑, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

180°, ↑, 90°と前腕中間位, 90°-180°前腕外転(肘外), 肩の屈伸

60°, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

30°, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

5, 右腕の屈伸, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

5, 左腕の屈伸, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

5, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心

(+) 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心, 肘の中心



(1) 前屈、指床間距離

後屈

側屈 指床間距離

回旋

EHL

FHL

SLR, ラベ-グ後伸

FNS

腰椎椎間関節左右回旋, L1/2, L2/3, L3/4, L4/5, L5/S1

(2) ト-ノテスト

股関節内旋テスト, 外旋テスト

ハット, フテスト

キョ-ネ-テスト

ニ-トンテスト

(9) PTR

ATR

ハビンスキ変形

SD, L4, L5,

S1

(11) 大腿屈曲筋 MMT

膝変形 外反

内反

屈曲

大腿周径 10cm, 5cm 直上

膝蓋足圧力

膝関節屈曲 ROM

膝蓋骨左回旋テスト

(12) 外反強剛テスト

内反強剛テスト

前屈引出しテスト

後屈引出しテスト

クワ-レーテスト

評価

(1) 右, 左 膝曲り 腕垂直に指と床との距離 (+) 痛なし (+) 距離測定, 膝伸張

(+) 左P, 立位, 後屈50°時膝に押さへて膝を伸張し, 痛なし (+) 膝伸張

(+) 膝伸, 立位, 側屈腕垂直に指と床との距離 (+) 痛なし (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 両膝, 屈曲, 深く, 足と固定, 両膝を伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

S, 仰臥位, 足伸張, 両膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

S, 仰臥位, 足伸張, 両膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 左手膝上, 右手膝上伸張位, 膝上伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張

(+) 腹臥位, 両膝上, 膝90°屈曲, 膝上伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張

(+) 腹臥位, L1-2 ~ L5 S1 椎間関節 (1.5cm), 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

(+) 仰臥位, 両膝伸張, 膝伸張 (+) 膝伸張, 膝伸張

# 鍼灸臨床学実習Ⅱ







5 撒利. 皮膚の  $30^{\circ}\text{C}$  以下に至る~膝より暖かい

# 鍼灸臨床学実習 II (2)

## ① 中樞神経系.

## 中樞神経の検査と治療

② 頭痛, 呼吸型4つ 片頭痛4つ (p116)  
コフキスト p114

③ 天柱, 風池, 肩井, 懸壺 / 天柱完骨和陽, 陶白  
曲溪: 肘部肘 頸椎と曲溪の中間 肩井: 頸部頸椎の中間

③ めまい・耳鳴, 難聴

④ 目門, 睛宮, 睛会, 圧痛点と翳風(耳と目の中間)に通電

眼窩の上下, 乳輪突起, 乳中乳, 〇乳, 乳輪

乳中乳, 〇乳, 乳輪

④ 虚部虚母, 虚部虚母  
コフキスト p118

手相性, 足相性

頂點率前 (p118)

⑤ 頸椎 C2, C6, 頭半棘筋上左右利筋, C2とC6に通電, 1Hz

⑥ 上肢伸筋群 (伸三連, 伸四上三) 前肢伸筋

⑦ 前肢伸筋 (伸三連, 伸四上三) 前肢伸筋 (10Hz)


⑧ 前肢伸筋, 承光, 目窓, 頸椎  
下肢 上肢 前

⑨ 陶白, 四白, 地倉, 翳風  
上ノ 下ノ 口角

上下格指 上下格指, 上下格

⑩ 前肢 (前1.5寸百会)

前肢 → 頸椎 → 下肢  
承光 → 頸椎 → (上肢)



⑤ パーキンソン病

⑥ 華院更替元 Th9 ~ 2 交互 6 元

左右5分, 頸椎間隙 1.5 ~ 2.0cm, 頸椎の側面  
下ノ: 下内ノに斜利

⑦ 外腰筋 ~ 内腰筋 EA 5Hz

曲池 ~ 合谷 EA 5Hz

腰筋: 外側上肢 下 (下側)

内腰筋: 内側上肢 下 (内側)

⑥ 小児, 脱毛

小児の脱毛, 小児の脱毛

2g ~ 2.5g

8 ~ 12g 100g 101g 201g


四神像 - 1/3

1/3 形 脱毛の基準 → 1/3 形

脱毛の基準と脱毛の手順



善正



指の腹の丸

中で5回くらいあてると  
112分50秒あたりから

37月12: 5021...

アール



あてり、おろし、お  
指の腹の丸のあたりから

大人

経路を5回くらい入ると、  
経路を反対側で圧縮  
たし、おろし、お

肩の

右肩100回くらいと肩甲骨の下

試験（通電）め、そのうち  
通電する  
10-15分

o <131 m?



C2  
P2x 513 P-C2

# 鍼灸臨床学実習Ⅲ

## 鍼灸臨床字実習Ⅱ

①

4/14 内科Ⅰ 224

腹部の触診 ... 現代医学の 1. 視診 2. 聴診 3. 打診 4. 触診 の順序 (右腹の検査)

09 区分を理解する

① 臍上区と臍下区

② 臍上区 - 触診する } 時計周り

③ 臍下区 - 触診する } 臍上区の後

はり. まわり

中腕. 腕元. 直刺 1cm 平温

天杞 木柱太 8分灸

5/12 1. 沢田流 神門 (11分灸 3回), 尺側.

2. 左大腸俞 10~20mm 50mm 20号

(外大腸俞) - 髂骨隆起の肋骨に直刺

3. 左腹結 10~20mm 12と上段の指の1/3. 背側. 針1.32

4. 腹内庭への透熱灸 (半柱太) - 熱(10分) 2指 ) 下痢

④ 中腕. 水分. 大丘. 天杞

腹内庭は おりては 131240 29日中央

5/18 天杞 11分灸 木柱太 5回

腕元. 中腕 斜刺 1cm 上へ1242

天杞 横刺 1cm



# <内科>外科>

[1] 便秘患者, 腸蠕動を誘発しC2 <場所>  
腹部経穴一穴に刺激 <経度, 手技>

[2] 下痢患者, 施灸を一箇行 <場所>  
<経度, 手技>

[3] 咳・痰患者, 胸部へ右, 2箇行, カ2ヤ3ニ  
<経度, 手技>

[4] 咳痰がせ症候群, 背脊 沅灸 <場所>  
<経度, 手技>

[5] 左下股下腿部肉變性循環不全冷2, 通電  
<経度>

[6] 右腕レイ一現象 沅灸 <場所>  
<経度>

[7] 頻尿, 排尿困難

[8] ED

[9] 顔面痛

[10] 歯痛, 顎関節痛

[11] 後頭部痛

<手指消毒可るニト -40点>

左股結 (臍と左上前腸骨棘の外1/3)  
1~3cm, 雀舌付2つの中り軽刺激

<左右とも> 右2指の腹に左の4, 折り曲4つ折, 2点  
透熱灸, 1本目半木粒, 2, 3本木粒大, 灸5分, 寧ろ内圧

右の腋府, 募中 (鎖骨縫乳下, 才1肋骨下)  
横刺, 正中に同40.5mm, 刺入部には2本 1本

大椎, 肩門 (T2), 肺俞 (T3)  
灸点紙, 半木粒大重灸, 各3本, 両側

大腿直筋部 (2), 前腓骨筋 (2) 筋腹上 (片側)  
2cm, 収縮したとき

右手三里, 上八邪 (腕内側, 中手指の中間を)  
1cm, しっかり入ることを

三陰交の太溪の後頸神経にビリビリ感があるとき  
2cm以上刺激, 筋力と伸縮性を助ける

○~○% 陰包 膝蓋骨脘~曲骨 1/4以下, 曲骨上, 経2筋の溝の間  
1cm, 直刺

陽白 (眉上上下), 四白 (下眼窩上), アジ (眼窩上1/4の内側)  
1cm 直刺, 3本一直線上に刺す アジの3本に5/6の

下関  
3cm, 直刺, 穴に3人入ることを

天柱 (外後頭隆起下1.5cm 左右2.5cm), 同地 (左右5cm)  
刺入深さ0.5~1.0cm 間隔2本, 直刺

# 鍼灸臨床学実習Ⅳ



## 鍼灸臨床学実習 IV

①

## ① 経筋病

- 1 全体輕撓。(陽・陰両方),
- 2 2 募元・俞穴の圧診 (12個)
- 3 ④ 魚際, 太淵, 二間, 三間, 液門, 中渚  
前谷, 後溪, 小府, 神門, 勞宮, 大陵
- 5 ⑤ 大都, 太白, 然谷, 太溪, 行間, 太衝  
内庭, 陷谷, 侠溪, 足臨泣, 足通谷, 束骨

## 経筋病

- 1 全体輕撓。(陽・陰両方)
  - 2 本経の輕撓。
  - 3 本経の撮診 (つまむ)
  - 4 隣接の経路の輕撓と撮診
  - 5 五行元と原穴の圧診, 同時に他の経路。
- 肝 肝: 大敦, 行間, 太衝, 中封, 曲泉
- 脾 脾: 隱白, 大都, 太白, 商丘, 陰陵泉
- 腎 腎: 湧泉, 然谷, 太溪, 復溜, 陰谷
- 胃 胃: 厲兌, 内庭, 陷谷, 衝陽, 解溪, 足三里
- 胆 胆: 足竊陰, 侠溪, 足臨泣, 丘墟, 陽輔, 陽陵泉
- 膀胱 膀胱: 至陰, 足通谷, 束骨, 京骨, 崑崙, 委中
- 肺 肺: 少商, 魚際, 太淵, 經渠, 尺澤
- 心 心: 少衝, 少府, 神門, 靈道, 少海
- 心包 心包: 中衝, 勞宮, 大陵, 間使, 曲澤
- 大腸 大腸: 商陽, 二間, 三間, 合谷, 陽池, 曲池 (肘の裏)
- 三焦 三焦: 關衝, 液門, 中渚, 陽池, 支溝, 天井
- 小腸 小腸: 少澤, 前谷, 後溪, 腕骨, 陽谷, 小海

## 筋府病

- 1 全2の募元の輕撓, 圧診
  - 2 指俞穴の全体輕撓。
  - 3 全2の指俞穴の圧診。
  - 4 郄穴, 經穴, 合穴の圧診 → 同時に他の経路。
- 募 中府, 膻中, 中脘, 巨關, 期門, 日月, 京門, 章門, 天樞, 石門, 關元, 中極
- 俞 肝: 厥陰, 心: 肝, 胆, 脾: 胃, 三焦: 陽, 大腸: 小腸, 膀胱
- 肝 肝: 中府, 靈道, 曲泉
- 脾 脾: 地機, 公孫, 陰陵泉
- 腎 腎: 太溪, 大鐘, 陰谷
- 胃 胃: 湧泉, 豐隆, 足三里
- 胆 胆: 井丘, 足陽, 陽陵泉
- 膀胱 膀胱: 金門, 環跳, 委中
- 肺 肺: 孔最, 列缺, 尺澤
- 心 心: 陰郄, 通里, 少海
- 心包 心包: 郄門, 內關, 曲澤
- 大腸 大腸: 溫經, 偏歷, 曲池
- 三焦 三焦: 會宗, 升陽, 天井, 小海, 支正, 小海







## 鍼灸臨床字実習Ⅴ

②

[4]. 頭痛 主病 腎虚腰痛

・耳鳴り 朝眠 主病 (交感性腰痛)

虚利

・めまい 主病 (良性発作性頭位めまい症, BPPV)

虚利

・耳鳴り, 朝眠, めまい 主病 (メニエール)

虚利

耳鳴り, 耳鳴り, 肥肝置め, 痛時及時的

ドレー, ノー, つしりょう, 痛時及時的

虚利, リンネ, ウーバー

ドレー, 閉眼足踏み, 肥肝置め

虚利, リンネ, ウーバー

ドレー, 閉眼足踏み, 肥肝置め

虚利, リンネ, ウーバー

ドレー, 閉眼足踏み, 肥肝置め

## ④実技

注意



右腎俞 直刺 2cm 送り込み

左失眠 半坐位太極針灸 5本

&lt;5回か着火でよい&gt;

・シャシはがす. 線香 火とつくる

・毛印はがす ~~手~~ 痛むいす. 手触り白くおろす

・ヒビスコール

・刺筋部 (腎俞). 失眠 消毒, 着火

・鍼をひく

・ヒビスコール, 声かけ

・腎俞 直刺 2cm 確認

・ヒビスコール

・抜鍼, 消毒, 声かけ

・施灸 一点火, 圧迫, 次の灸, 消火

・ヒビスコール

・拍消毒, 灰とく. 患部消毒, 消火

・毛印かけ



実技, 9月10日

⑦ 準備

試験ノート

学籍番号, 氏名, 言う

問題と読む, 腹臥位指示

一旦タオルをかつ, 施術部位「広く」露出  
線香へ点火, 茶点器確認

銅箱の銅を取り出す

タオルで足まくりを作る

【今から銅とお灸をします】

骨の位置と確認 T2(腎俞)<sup>1</sup> L11(脾)<sup>2</sup>

○手指消毒(ヒビスロール)

銅をむく(大まか), 消毒 → 取り出す

○手指消毒, 綿花4枚取り出す(7ツバキ)

2枚で背中全体消毒, 1枚左腎俞, 右脾俞

2枚で踵上 → 下, 失眠 左右

○手指消毒【★今から銅をします】

右脾俞 捻捻 1cm

左腎俞 捻捻 2cm

○手指消毒, 線花2枚 4ツ折り

右脾俞 捻捻 捻捻 捻捻 捻捻 捻捻 捻捻

左腎俞 捻捻 捻捻 捻捻 捻捻 捻捻 捻捻

右脾俞, 左腎俞 捻捻と消毒(タオル)

○茶点器でルー

② 失眠 未粒大透熱灸 5粒 灰おこ  
(1回目熱緩和, 2回目不要)

【今から灸をします, 熱かと言え, 2下を】

左失眠, 未粒大透熱灸 5粒, 灰おこ

【お灸をします, 熱かと言え, 2下を】

○手指消毒 綿花3枚

1: 指先消毒

2: 灰, 茶点を取り

3: 施術部の消毒(消毒)

4: 線花で線香の火をかつ

タオルをかつ

【お灸をします, 熱かと言え, 2下を】

本書の一部あるいは全部を、無断で複製、  
転載すること、インターネットで掲載する  
ことは、著作権者および出版社の権利の  
侵害となります。

あらかじめ許諾をお求めください。

本書を無断で複製する行為（コピー、  
スキャンなど）は、「私的使用のための  
複製」など著作権法上の限られた例外を  
除き、禁じられています。

また、複写物やスキャンデータを他者へ  
譲渡・販売することも違法となります。

## 東洋医学シリーズ クエスチョンバンク

発行者 大塚 信之

発行所 蛭東洋医学研究所

**HARI** Hotal Ancient-medicine Research Institute

住所 大阪府豊中市蛭池中町

<http://otsuka.holding.jp/HARI/>

E-mail : [hari@otsuka.holding.jp](mailto:hari@otsuka.holding.jp)

---

Printed in Japan ©2020 東洋医学研究所